

Voltaren Emulgel 1%, 10 mg / g, żel, 50 g

Cena: 32,78 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VOLTAREN
Opakowanie	50 g
Postać	Żel
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 14 lat

Opis produktu

Opis

Voltaren Emulgel 1% to biały żel przeznaczony do wcierania w skórę, który ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwobrzękowe.

Wskazania

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwreżeń lub stłuczeń),
- bólu pleców,
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat):

- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dawkowanie

Voltaren Emulgel 1% należy stosować miejscowo na skórę trzy lub cztery razy na dobę delikatnie wcierając.

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy w postaci soli dietyloamoniowej diklofenaku.

100 g leku zawiera 1 g diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum) w postaci 1,16 g soli dietyloamoniowej diklofenaku.

- Pozostałe składniki leku to: dietyloamina, cetiol LC, cetomakrogol 1000, Carbopol 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45- zawiera benzoesan benzylu), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Voltaren Emulgel 1%

- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak lub glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków

zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni,

- w trzecim trymestrze ciąży,
- u osób poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

- Rzadko (występują mniej niż u 1 do 10 na 10 000 osób stosujących lek): Wysypka skórna z pęcherzykami; pokrzywka.
- Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma).

Ostrzeżenia

- Lek zawiera glikol propylenowy i benzoesan benzylu, które u niektórych osób mogą powodować podrażnienia skóry.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30 st. C

Producent

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
W. Rzymowskiego 53
Warszawa

Galeria

Przyspiesza leczenie



Wróć do formy szybciej*

*W badaniu przeprowadzonym u pacjentów ze złamaniem kości, średni czas osiągnięcia 50% redukcji bólu odczuwalnego podczas ruchu wyniósł 4 dni w grupie osób stosujących Voltaren Max, w porównaniu do 8 dni w grupie stosującej placebo.

3 Potrójny efekt

- 1 Redukuje ból
- 2 Zwalcza stan zapalny
- 3 Zmniejsza obrzęk

