

Voltaren Emulgel 1%, 10mg/g, żel, 50 g (import równoległy, InPharm)

Cena: 21,10 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 14 lat

Opis produktu

Opis

Voltaren Emulgel 1% to biały żel, który stosuje się do aplikacji na skórę.

Wskazania

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat

- pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń)
- bólu pleców
- ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe.

Dorośli (powyżej 18 lat)

- ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Działanie

Substancja czynna leku - diklofenak należy do grupy leków, znanych jako niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Ze względu na wodno-alkoholowe podłoże Voltaren Emulgel 1% wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Lek działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Dawkowanie

Ilość żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo: 2 g do 4 g leku Voltaren Emulgel 1%

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy w postaci soli dietyloamoniowej diklofenaku.
- Pozostałe składniki leku to: dietyloamina, ester kwasu kaprynowego/kaprylowego i alkoholu C12-C18 (Cetiol LC), cetomakrogol 1000, Carbomer 974P, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, ciekła parafina, substancja zapachowa (Perfume cream 45), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na diklofenak lub glikol polietylenowy lub inny składnik leku.
- Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa.
- W trzecim trymestrze ciąży.
- U osób poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

- Często (występują mniej niż u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek): Wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.
- Bardzo rzadko (występują mniej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): Zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne. Objawami nadwrażliwości są oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami.

Ostrzeżenia

- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Nie stosować po upływie 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Producent

INPHARM/NOVARTIS CONSUMER
Genewska 6A
Warszawa