

Voltaren Max, 23,2 mg/g, żel, 100 g

Cena: 64,18 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VOLTAREN
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwozrękowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 14 lat

Opis produktu

Opis

Voltaren MAX to lek o właściwościach przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przeciwobrzękowych.

Wskazania

Lek Voltaren MAX stosuje się w leczeniu pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, bólu pleców.

Działanie

Voltaren MAX działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 14 lat: należy go stosować 2 razy na dobę na bolące miejsca.

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak dietyloamoniowy (Diclofenacum diethylammonium).
- 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego co odpowiada 20 mg diklofenaku sodowego.
- Substancją pomocniczą: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, glikol propylenowy, kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, makrogolu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, butylohydroksytoluen (E 321), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Voltaren MAX:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków

zawierających kwas acetylosalicylowy (stosowany również, jako lek przeciwzakrzepowy), ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni, gorączki i stanów zapalnych,

- w trzecim trymestrze ciąży,
- u dzieci poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- wysypka skórna,
- świąd,
- zaczerwienienie lub pieczenie skóry,
- zapalenie skóry.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób):

- zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski. Należy zaprzestać stosowania leku, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka.
- Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry oraz przez długi okres czasu, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza.
- Lek Voltaren MAX jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w jamie ustnej, nie połykać. Po użyciu należy umyć ręce. Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Lek może być stosowany jednocześnie z bandażami lub opatrunkami zwykle stosowanymi w przypadku skręceń, jednak nie należy stosować go pod opatrunki uniemożliwiające dostęp powietrza.
- Lek Voltaren MAX zawiera glikol propylenowy, który u niektórych osób, może powodować podrażnienie skóry.
- Lek Voltaren MAX zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórą lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
mystory.pl@haleon.com

Galeria

