

Voltaren Max, 23,2 mg/g, żel, 120 g

Cena: 49,55 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VOLTAREN
Opakowanie	120 g (tub.)
Postać	Żel
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwozrękowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Voltaren Max to żel o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i redukującym obrzęki. Zawiera diklofenak, substancję należącą do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Preparat stosuje się w leczeniu stanów zapalnych wynikających z urazów ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, a także w łagodnej postaci zwyrodnienia stawów. Aplikacja polega na wmasowaniu żelu bezpośrednio w obszar dotknięty bólem.

Wskazania

Lek Voltaren Max stosuje się w leczeniu pourazowych stanów zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów, bólu pleców.

Działanie

Voltaren Max działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Dzięki zawartemu w żelu diklofenakowi lek przynosi ulgę w bólu, redukuje stan zapalny i obrzęki występujące w okolicach mięśni i stawów.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych i dzieci powyżej 14 lat to wmasowywanie odpowiedniej ilości żelu na bolące miejsce 2 razy na dobę

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak dietyloamoniowy (Diclofenacum diethylammonium).
- 1 gram żelu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego.
- Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, alkohol oleinowy, kokozylokaprylokapronian, parafina ciekła, makroglu eter cetostearylowy, karbomer, dietyloamina, kompozycja zapachowa eukaliptusowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Voltaren Max, jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła u niego reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy (stosowany również, jako lek przeciwzakrzepowy), ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni, gorączki i stanów zapalnych.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry, zapalenie skóry.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 osób): zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent ma uszkodzoną skórę, otwarte rany, wypryski. Należy zaprzestać stosowania leku, jeśli po jego użyciu pojawi się wysypka.
- Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry oraz przez długi okres czasu, jeśli nie zostało to zalecone przez lekarza.
- Lek Voltaren Max jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w jamie ustnej, nie połykać. Po użyciu należy umyć ręce. Należy unikać kontaktu żelu z oczami. Jeżeli lek dostanie się do oczu, należy przemyć je czystą wodą i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Lek może być stosowany jednocześnie z bandażami lub opatrunkami zwykle stosowanymi w przypadku skręceń, jednak nie należy stosować go pod opatrunki uniemożliwiające dostęp powietrza.
- Lek Voltaren Max zawiera glikol propylenowy, który u niektórych osób, może powodować podrażnienie skóry.
- Lek Voltaren Max zawiera butylohydroksytoluen, który może powodować miejscową reakcję skórą lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
mystory.pl@haleon.com

Galeria

