

Vratizolin, 30 mg/g, krem, 3 g

Cena: 39,97 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VRATIZOLIN
Opakowanie	3 g
Postać	krem
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Vratizolin to lek przeciwwirusowy stosowany w leczeniu opryszczki ust i twarzy wywołanej wirusem Herpes simplex.

Wskazania

Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex).

Działanie

Vratizolin wykazuje działanie przeciwwirusowe ze względu na zawarty w leku denotywir - substancję należącą do leków przeciwwirusowych. Denotywir skraca czas trwania choroby, zastosowanie leku Vratizolin w okresie tzw. prodromalnym może zapobiec rozwojowi choroby (nie jest to jednak działanie zapobiegawcze).

Dawkowanie

Skórę zmienioną chorobowo aplikować kilka razy dziennie, należy nanosić niewielką ilość kremu.

Skład

- Substancją czynną jest: denotywir (Denotivirum).
- 1 g kremu zawiera 30 mg denotywiru.
- Substancje pomocnicze: alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina biała, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vratizolin:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na denotywir, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.



Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- miejscowe reakcje jak podrażnienie skóry w miejscu aplikacji, kontaktowe zapalenie skóry,
- objawy nadwrażliwości.

Ostrzeżenia

- Lek Vratizolin przeznaczony jest do stosowania miejscowego na wargi i skórę twarzy. Lek nie powinien być używany na błony śluzowe, do oczu, w okolicach narządów płciowych.
- Osoby z leczoną opryszczką powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa w trakcie leczenia - powinny unikać niepotrzebnego dotykania miejsca zmienionego chorobowo oraz powinny unikać dotykania ręcznikiem miejsca z opryszczką.
- W przypadku opryszczki o ciężkim przebiegu, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli leczenie przerwane jest zbyt szybko, objawy choroby mogą ulec pogorszeniu.
- Vratizolin zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne jak kontaktowe zapalenie skóry.
- Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienia skóry.
- Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan - mogą powodować reakcje alergiczne, także typu późnego.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Bausch Health Poland sp. z o.o.