

Węgiel leczniczy, 200 mg, kapsułki twarde, 30 szt. (Norit)



Cena: 16,85 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 kapsułek
Postać	Kapsułki twarde
Producent	CABOT NORIT NEDERLAND B.V.
Przeznaczenie	Przeciwbiegunkowe, Wiatropędne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Węgiel leczniczy (Norit) to roślinny produkt leczniczy o silnych właściwościach adsorpcyjnych.

Wskazania

Produkt leczniczy przeznaczony do stosowania w przypadku: nieżyłtów jelit, biegunki, wzdęć, nadmiernej fermentacji jelitowej, np. przy zmianach klimatu lub składu pokarmu, jako lek uzupełniający w leczeniu zatruc toksycznymi substancjami za wyjątkiem, zatruc cyjankami, mocnymi kwasami i zasadami - po porozumieniu z lekarzem.

Działanie

Węgiel aktywny (Noris) ma dużą zdolność absorbującą. W przewodzie pokarmowym wiąże drażniące i toksyczne substancje, uniemożliwiając ich wchłonięcie.

Dawkowanie

- Biegunka: 3-4 kapsułki twarde jednorazowo doustnie, popijając niewielką ilością wody.

W razie konieczności można dawkę powtórzyć 3 lub więcej razy w ciągu dnia. W razie długotrwałej lub nawracającej biegunki należy zasięgnąć porady lekarza.

- Zatrucie: Niezwłocznie zażyć 10 kapsułek twardych (jedna po drugiej popijając niewielką ilością wody).

Dawkę należy powtórzyć kilkakrotnie po krótkich przerwach. Natychmiast zawiadomić lekarza. Zawiesinę węgla aktywowanego można podawać przez zgłąbnyk żołądkowy np. podczas płukania żołądka. W przypadku zatrucia i jeśli natychmiastowy kontakt z lekarzem nie jest możliwy, należy jak najszybciej zażyć węgiel leczniczy. Im wcześniej węgiel leczniczy jest zastosowany, tym lepszy jest wynik jego działania.

Skład



- Substancją czynną leku jest: węgiel leczniczy (Carbo medicinalis).
- Substancje pomocnicze leku to: żelatyna, dwutlenek tytanu (E171), żelaza tlenek czarny (E172)

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Węgiel leczniczy (Norit): jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku, jeśli u pacjenta występuje rozstrój żołądka, podejrzenie niedrożności jelit, ostry ból brzucha i wrzodziejące zapalenie okrężnicy (fragmentu jelita grubego), u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

Ostrzeżenia

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

NORIT
Nijverheidsweg-Noord 72, Holandia
Amersfoort