


Woda utleniona 3%, roztwór na skórę, 100 g



Cena: 2,43 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	100 g
Postać	Roztwór
Producent	LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne), Dezynfekujące (odkażające), Oczyszczające
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Woda utleniona 3% to roztwór leczniczy stosowany na skórę lub do płukania jamy ustnej. Dzięki bakteriobójczym właściwościom nadtlenu wodoru jest przeznaczona do przemywania ran skórnych. Może być również używana jako środek do płukania jamy ustnej i kieszonek zębowych w stanach zapalnych przy chorobach przyzębia. Ze względu na swoje działanie, woda utleniona jest polecana do dezynfekcji mniejszych ran powierzchownych i otarć.

Wskazania

Lek woda utleniona 3% wskazany jest do przemywania niewielkich otarć i ran oraz do płukania jamy ustnej w przypadku chorób przyzębia oraz stanów zapalnych kieszonek zębowych.

Działanie

Działanie leku określa powstawanie charakterystycznej piany, którą jest tlen komórkowy. Wykazuje on działanie bakteriobójcze oraz oczyszcza rany.

Dawkowanie

- Roztwór na skórę, roztwór do płukania jamy ustnej.
- Do przemywania ran stosować 3% roztwór nadtlenu wodoru.
- Do płukania jamy ustnej lub błon śluzowych rozcieńczyć 1 łyżkę stołową preparatu (15 ml) w szklance wody (250 ml).

Skład

100 g roztworu zawiera:

- substancje czynne: wodoru nadtlenu 30% 10,0 g (stabilizowany: cynianem sodu trójwodnym, kwasem 1-hydroksyetano-1,1-difosfonowym, azotanem amonu, pirofosforanem potasu),



- substancje pomocnicze: woda oczyszczona 90,0 g

Przeciwwskazania

- Nie stosować leku Woda utleniona 3% jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na wodoru nadtlenu.
- Lek nie należy stosować w ostrych wrzodziejących zapaleniach dziąseł, gdyż może dojść do bolesnego uszkodzenia tkanek spowodowanego gwałtownym uwolnieniem tlenu.

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących działań lub objawów niepożądanych w trakcie przyjmowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

W przypadku stosowania wody utlenionej u dzieci należy zachować szczególną ostrożność.

Ciąża i okres karmienia:

- Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Preparat nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Producent

LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN