

Xedine HA 1 mg/ ml, aerozol do nosa dla dzieci powyżej 12 lat i dorosłych, 10 ml



Cena: 25,29 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	XEDINE
Opakowanie	10 ml (but.)
Postać	Aerozol
Producent	RANBAXY POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Oczyszczające, Przeciwozbrętkowe, Przeciwzapalne, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Xedine HA to lek w postaci aerozolu do nosa, przeznaczony dla dzieci od 12 roku życia oraz dorosłych. Jest stosowany w celu leczenia przekrwienia błony śluzowej nosa, które może być wynikiem zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok.

Formuła Xedine HA zawiera chlorowodrek ksylometazoliny, kwas hialuronowy oraz wodę morską, co zapewnia potrójne działanie: leczenie, nawilżanie i oczyszczanie błony śluzowej nosa. Chlorowodrek ksylometazoliny zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny, ułatwiając oddychanie. Kwas hialuronowy działa ochronnie i nawilżająco na śluzówkę nosa. Efekty stosowania preparatu utrzymują się do 10 godzin.

Xedine HA występuje jako bezbarwny, sterylny roztwór bez konserwantów. Produkt jest zapakowany w plastikową butelkę z pompką dozującą i aplikatorem do nosa oraz ochronną nasadką. Jego stosowanie jest bezpieczne i nie powoduje przesuszenia błony śluzowej nosa.

Wskazania

Objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa spowodowanego zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok.

Działanie

- Zwężanie naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa i gardła, co zmniejsza przekrwienie, obrzęk i wysięk.
- Udrażnianie przewodów nosowych oraz przewodów prowadzących z jamy nosowej do zatok przynosowych,
- Zmniejszanie wycieku z nosa i ułatwianie oddychania przez nos.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 1 rozpylenie do każdego otworu nosowego do 3 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: chlorowodorek ksylometazoliny 1 mg,
- substancje pomocnicze: woda morską oczyszczoną, potasu diwodorofosforan, sodu hialuronian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na chlorowodorek ksylometazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Suche zapalenie błony śluzowej nosa (rhinitis sicca)
- Przebyta ostatnio operacja neurochirurgiczna (usunięcie przysadki wykonane przez zatokę klinową nosa lub jakakolwiek inna operacja neurochirurgiczna przebiegająca z odsłonięciem zewnętrznej warstwy mózgu (opony mózgowej)).
- Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, a szczególnie jaskra z wąskim kątem przesączania.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- ból głowy,
- przejściowe i łagodne objawy podrażnienia, takie jak pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa i (lub) gardła,
- kichanie.

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- reakcje alergiczne (wysypka, świąd, obrzęk skóry i błon śluzowych),
- uczucie „zatkania” nosa (po zakończeniu działania leku),
- krwawienie z nosa.

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

- zawroty głowy,
- uczucie bicia serca (kołatanie serca),
- przyspieszone bicie serca,
- podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
- przejściowe zaburzenia widzenia,
- nudności.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- nerwowość, niepokój,
- trudności w zasypianiu, zaburzenia snu,
- senność i (lub) ospałość (głównie u dzieci),
- omamy lub drgawki (głównie u dzieci),
- nieregularne bicie serca,
- zatrzymanie oddechu (bezdech) u małych dzieci i noworodków.

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność stosując Xedine HA jeśli u pacjenta występuje cukrzyca lub nadczynność tarczycy, choroba serca np. choroba niedokrwienna serca, zespół długiego odstępu QT lub nadciśnienie tętnicze lub jeśli dolegliwości utrzymują się przez kilka dni, ponieważ lek nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

RANBAXY