

Xenna 30 mg, zioła przeciw zaparciom, 40 saszetek



Cena: 25,50 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	XENNA
Opakowanie	40 saszetek
Postać	Saszetki
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeczyszczające, Wspomaganie pracy jelit
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Xenna zioła przeciw zaparciom to preparat w postaci saszetek z suszonymi liśćmi senesu, przeznaczony do zaparzania. Jest to lek przeczyszczający o łagodnym działaniu, które zaczyna być zauważalne po 8-12 godzinach od przyjęcia. Głównym składnikiem czynnym są antranoidy, znane również jako sennozydy, znajdujące się w liściach roślin z rodzaju Senna Mill. Każda saszetka zawiera 0,9-1,1 g liści *Cassia angustifolia* Vahl i/lub *Cassia senna* L., co odpowiada 30 mg związków antranoidowych, przeliczone na sennozyd B.

Wskazania

Zioła przeczyszczające do stosowania w doraźnym leczeniu zaparć. Xenna to lek pobudzający czynność jelita grubego i powodujący zmiękczenie stolca.

Działanie

Przeczyszczające.

Dawkowanie

Dorośli, osoby starsze i młodzieży w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetkę (0,9 g - 1,1 g) zalać szklanką wrzącej wody (ok. 200 ml) i pozostawić do zaparzenia na 10 minut.

Skład

1 saszetka zawiera:

- *Senae folium* 0,9 g - 1,1 g co odpowiada 30 mg antranoidów w przeliczeniu na sennozyd B.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość (alergia) na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników tego leku.

- W przypadku niedrożności jelit.
- W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego.
- W przypadku ostrych chorób zapalnych jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).
- W przypadku bólów brzusznych nieznanego pochodzenia lub w stanach odwodnienia z utratą elektrolitów.
- Nie podawać produktów zawierających senes dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Częstość nieznana:

- Skurcze i bóle brzucha, biegunki z wodnistym stolcem, w szczególności u osób z zespołem nadpobudliwego jelita. Reakcja taka może być spowodowana przyjęciem zbyt wysokiej dawki leku, wówczas konieczne jest zmniejszenie dawki leku. Przewlekłe stosowanie może prowadzić do zaburzeń pigmentacji okrężnicy (zmiana koloru błony śluzowej jelita na brązowy), które ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu.
- Reakcje nadwrażliwości: świąd, pokrzywka, wysypka występująca miejscowo lub na całym ciele.
- Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, a szczególnie albuminuria (występowanie drobnocząsteczkowych białek w moczu), hematuria (występowanie krwi w moczu) w przypadku przewlekłego stosowania preparatu.
- Zmiana barwy moczu na żółty lub czerwono-brązowy (efekt nie powoduje konieczności odstawienia preparatu).

Ostrzeżenia

Lek Xenna nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. Stosowanie leków przeczyszczających przez dłuższy czas niż zalecany może prowadzić do upośledzenia funkcji jelit i uzależnienia od środków przeczyszczających. Decyzję o stosowaniu przez okres dłuższy niż 7-14 dni może podjąć lekarz.

- W przypadku gdy zachodzi potrzeba codziennego stosowania środka przeczyszczającego, zaleca się konsultację z lekarzem w celu ustalenia przyczyny zaparcia.
- Lek Xenna powinno się stosować tylko wówczas, gdy nie można osiągnąć prawidłowego wypróżnienia poprzez zmianę diety.

W przypadku, gdy występują jakiegokolwiek niezdiagnozowane ostre lub utrzymujące się objawy brzuszne, nie należy stosować leku bez konsultacji z lekarzem.

- Nie stosować u pacjentów z zaklinowaniem kału oraz z dolegliwościami ze strony układu pokarmowego, takimi jak: ból brzucha, nudności i wymioty, chyba że lekarz zdecyduje inaczej. Objawy takie mogą wskazywać na możliwość wystąpienia niedrożności jelit. W przypadku równoczesnego stosowania glikozydów nasercowych przed zastosowaniem zaleca się konsultację z lekarzem.
- Stosowanie leków przeczyszczających przez pacjentów z nietrzymaniem stolca wymaga wzmożonej higieny okolic narażonych na kontakt z kałem.

Producent

US PHARMACIA
Ziębicka 40
Wrocław