

Xylometazolin Apteo Med 1 mg/g Krople do nosa, 10 ml



Cena: 7,44 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	APTEO
Opakowanie	10 ml (but.)
Postać	Roztwór
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Katar
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Xylometazolin Apteo Med to lek o działaniu miejscowym, który redukuje przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych. Dzięki temu pomaga osobom odczuwającym zatkanie nosa łatwiej oddychać.

Wskazania

Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Xylometazolin Apteo Med ułatwia wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

Składniki

Substancją czynną leku Xylometazolin Apteo Med jest Ksylometazoliny chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg Ksylometazoliny chlorowodoru, co odpowiada 0,012 – 0,016 mg/kroplę (0.014 ± 15%).
Pozostałe składniki leku to: Sodu chlorek, Benzalkoniowy chlorek, Roztwór, Disodu fosforan dwuwodny, Potasu diwodorofosforan, Woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Xylometazolin Apteo Med:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta),
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku),
- jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).



Działania niepożądane

- Trudności w oddychaniu lub przełykaniu,
- Opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła,
- Świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami.

Ostrzeżenia

Przed zastosowaniem leku Xylometazolin Apteo Med należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
- choroby serca (np. zespół długiego odstępu QT),
- nadczynności tarczycy,
- cukrzycy,
- rozrostu gruczołu krokowego,
- łagodnego nowotworu nadnercza, który wytwarza duże ilości adrenaliny i noradrenaliny (guz chromochłonny),
- przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub w przypadku przyjmowania ich w ciągu ostatnich 2 tygodni,
- nadwrażliwości na substancje o działaniu podobnym do ksylometazoliny. U wrażliwych pacjentów Xylometazolin Apteo Med może powodować bezsenność, zawroty głowy, nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi lub drżenie.

Producent

SYNOPTIS PHARMA