

Xylometazolin Teva (Xylomet.123ratio), 1 mg/ml (0,1%), aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 23,09 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	XYLOMETAZOLIN
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 10 lat

Opis produktu

Opis

Xylometazolin 123ratio to aerozol do nosa.

Wskazania

- Xylometazolin 123ratio jest stosowany do krótkotrwałego leczenia objawów niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych.
- Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych.

Działanie

Xylometazolin 123ratio zawiera substancję czynną zwaną ksylometazoliną. Jest to lek udrażniający o miejscowym działaniu, który zmniejsza przekrwienie błony śluzowej i łagodzi uczucie „zatkanego” nosa. Lek zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, typowa dawka dla dorosłych i dzieci w wieku 10 lat i starszych wynosi 1-2 dawki aerozolu Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml do każdego otworu nosowego, w zależności od potrzeby, ale maksymalnie do 3 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest ksylometazolinę chlorowodorek. Każda dawka (odpowiadająca 0,09 ml roztworu) zawiera 0,09 mg ksylometazolinę chlorowodoru.
- Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, glicerol 85%, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xylometazolin 123ratio

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazolinę chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Xylometazolin 123ratio
- jeśli pacjent niedawno przeszedł zabieg neurochirurgiczny (przezklinowego usunięcia przysadki lub inną operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej),
- jeśli pacjent cierpi na suchy nieżyt nosa (postać przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa powodująca suche zapalenie błony śluzowej nosa, któremu towarzyszy tworzenie się strupów),
- u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Działania niepożądane

Często

- nieznaczne, przemijające objawy podrażnienia, takie jak: pieczenie lub suchość błony śluzowej nosa (tkanki wewnątrz nosa) i/lub gardła, kichanie.

Niezbyt często

- reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, świąd, obrzęk skóry i błon śluzowych),
- po ustaniu działania silne uczucie zatkania nosa,
- krwawienie z nosa.

Rzadko

- kołatanie serca (palpitacje),
- przyspieszona czynność serca,
- podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
- nudności.

Bardzo rzadko

- nerwowość (zniecierpliwienie),
- trudności z zasypianiem lub spaniem (bezsenność),
- senność/ospałość (głównie u dzieci),
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- omamy lub napady drgawek (głównie u dzieci),
- niemierna czynność serca,
- zatrzymanie oddechu (bezdech) u niemowląt i noworodków.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania należy zwrócić się do lekarza w przypadku:

- przyjmowania określonych leków przeciwdepresyjnych zwanych inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) lub innych leków, które mogą powodować zwiększenie ciśnienia tętniczego,
- choroby wieńcowej lub nadciśnienia,
- guza nadnercza (guza chromochłonnego),
- zaburzeń metabolicznych, takich jak nadczynność tarczycy lub cukrzyca.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa

Galeria

