

Xylometazolin VP 1 mg/ g, krople do nosa, roztwór 10 ml



Cena: 8,38 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	XYLOMETAZOLIN VP
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do nosa
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Udrażniające nos, Ułatwiające oddychanie
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Xylometazolin VP to lek stosowany w celu udrożnienia nosa, który zmniejsza obrzęk błony śluzowej i ułatwia oddychanie. Należy unikać jego długotrwałego stosowania.

Wskazania

Niedrożność przewodów nosowych spowodowana obrzękiem błony śluzowej nosa w przebiegu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa (np. w przeziębieniach i grypie). Zapalenie zatok przynosowych. Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny).

Działanie

Lek zwęża naczynia krwionośne błony śluzowej nosa i gardła zmniejszając jej przekrwienie, obrzęk i wysięk. Udrażnia przewody nosowe oraz przewody prowadzące z jamy nosowej do zatok przynosowych, zmniejsza wyciek z nosa i ułatwia oddychanie przez nos.

Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli: miejscowo, 2 do 3 kropli leku do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest ksylometazolinowy chlorowodorek. 1g kropli do nosa zawiera 1mg ksylometazolinowego chlorowodoru. Pozostałe składniki leku to: disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, sodu chlorek, benzalkoniowy bromek (10% roztwór), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na ksylometazolinę, inne leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku, przewlekłe zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania. Nie stosować u dzieci w wieku do 12 lat.



Ostrzeżenia

Zachować szczególną ostrożność stosując Xylometazolin VP:

- jeśli u pacjenta występuje cukrzyca lub nadczynność tarczycy,
- jeśli u pacjenta występuje choroba serca np. choroba niedokrwienna serca, zespół długiego odstępu QT lub nadciśnienie tętnicze,
- jeśli dolegliwości utrzymują się przez kilka dni, ponieważ lek nie powinien być stosowany dłużej niż 5 dni.

Producent

ICN POLFA RZESZÓW
Przemysłowa 2
Rzeszów