

Xylorin Protect 0,5 mg/ml, aerozol do nosa, 7,5 ml



Cena: 30,83 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	7,5 ml
Postać	Aerozol
Producent	PERRIGO POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Udrażniające nos, Ułatwiające oddychanie
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Produkt **Xylorin Protect 0,5 mg** to lek w postaci aerozolu do nosa, przeznaczony do krótkotrwałego leczenia niedrożności nosa wywołanej przeziębieniem. Jest wskazany w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa oraz zapalenia zatok.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie niedrożności nosa spowodowanej przeziębieniem u dorosłych i dzieci w wieku do 10 lat.

Działanie

Zmniejszające obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, prowadzące do udrożnienia nosa i ułatwienia oddychania przez nos oraz zmniejszenia ilości zalegającej wydzieliny.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat: 2 rozpylenia do każdego nozdrza, 2 do 3 razy na dobę.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: oksymetazoliny chlorowodorek 0,5 mg,
- pozostałe składniki: deksopentanol, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwuwodny, sodu chlorek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na oksymetazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Jaskra z wąskim kątem przesączania.
- Nadwrażliwość na leki adrenergiczne.



- Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.
- Nie stosować po zabiegach usunięcia przysadki i zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej.

Działania niepożądane

Niezbyt częste (u 1 na 100 pacjentów):

- kichanie, suchość jamy ustnej i gardła.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

- niepokój, drażliwość, miejscowe podrażnienie nosa, zaburzenia snu u dzieci.

Ostrzeżenia

- Rozpoczęcie stosowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Dłuższe lub częstsze niż zalecane stosowanie leku może spowodować polekowy obrzęk błony śluzowej nosa.
- Należy zwracać uwagę, aby nie zanieczyścić leku drobnoustrojami; w celu zminimalizowania ryzyka rozszerzania się zakażenia lek powinien być używany tylko przez jedną osobę.
- Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.

Producent

Perrigo Poland Sp.z o.o.
Al. Niepodległości 18 BTD Office Center, 2 piętro
02-653 Warszawa