

Zinkorot, 25 mg Zn²⁺, tabletki, 20 tabletek

Cena: 21,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	WOERWAG PHARMA GMBH & KO.KG
Przeznaczenie	Wspomagające, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Suplement diety
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zinkorot to lek w postaci tabletek, który uzupełnia niedobory cynku. Stosuje się go, gdy dieta nie wystarcza do pokrycia zapotrzebowania na cynk. Zinkorot można podawać dorosłym oraz dzieciom powyżej 6. roku życia.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania tabletek Zinkorot są niedobory cynku, których pacjent nie może uzupełnić dietą.

Działanie

Działanie tabletek Zinkorot polega na uzupełnianiu niedoborów cynku.

Cynk to pierwiastek występujący w śladowych ilościach w organizmie, ale jest niezbędny do jego prawidłowego funkcjonowania. Pierwiastek ten wpływa na czynności układu odpornościowego, gojenie się ran, odczuwanie smaku i zapachu. Cynk odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu tarczycy, procesach rozwoju oraz wzroście, czynnościach układu nerwowego a także działaniu insuliny.

Dawkowanie

Zwykle stosowane dawkowanie leku Zinkorot zależy od wieku pacjenta. U dorosłych oraz młodzieży w wieku 12 do 17 lat zwykle stosuje się 12,5 do 25 mg cynku, czyli od pół do 1 tabletki dziennie. W przypadku dzieci w wieku od 6 do 11 lat dawkowanie wynosi pół tabletki na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest cynk w formie ortonianu cynku dwuwodnego (Zinci orotas dihydricus).
- 1 tabletkę zawiera 25 mg cynku w postaci 157,36 mg ortonianu cynku dwuwodnego.
- Substancje pomocnicze: krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-30, kroskarmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Zinkorot jest nadwrażliwość na orotonian cynku lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): na początku leczenia, sole cynku mogą powodować bóle brzucha, nudności, niestrawność i biegunkę. Objawy te występują częściej jeśli cynk przyjmowany jest na pusty żołądek. Objawy ustępują szybko po zaprzestaniu stosowania leku.

Ostrzeżenia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Calwer Str. 7
71034 Boblingen